Introducción al Modelado de Nichos Ecológicos y Distribuciones de Especies

Enrique Martínez Meyer

Instituto de Biología
Universidad Nacional Autónoma de México

¿Qué es la distribución geográfica de una especie?

En la definición más simple, es su arreglo espacial en el planeta. Es la descripción geográfica de donde vive.

La distribución de las especies se infiere a través de los registros colectados desde hace siglos en las exploraciones biológicas

Representación de la distribución de las especies

Tradicionalmente, la distribución de las especies se ha representado de manera cartográfica a partir de los puntos georreferenciados sobre mapas

Harvest Mouse Records 2009

Harvest Mouse Records 2009 (10 km)

Sin considerar los factores locales que la determinan

¿Qué determina la presencia de una especie en un lugar?

El concepto de nicho ecológico según Hutchinson

El hipervolumen n -dimensional en el que cada punto corresponde a un estado del ambiente que permite a las poblaciones de una especie existir indefinidamente

O sea:

El conjunto de condiciones ambientales (biótico y abiótico) bajo las cuales las poblaciones de una especie pueden sobrevivir indefinidamente sin la necesidad de inmigración

Las nuevas tecnologías y disciplinas emergentes, como la *Informática de la Biodiversidad*, han impulsado el desarrollo de enfoques metodológicos que permiten generar información útil a partir de datos incompletos; como el caso del modelado de los nichos ecológicos y distribuciones geográficas

Con los modelos de nicho ecológico se han generado cientos o quizás miles de investigaciones en los últimos 10 años

Regionalization of the avifauna of the Baja California Peninsula, Mexico: a parsimony analysis of endemism and distributional modelling approach

Octavio R. Rojas-Soto ^{1*}, Othón Alcántara-Ayala ² and Adolfo G. Navarro ¹

¹ Museo de Zoología and ² Herbario, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City, Mexico

Correspondence to *Museo de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Apartado Postal 70-399, México DF 04510, Mexico. E-mail: orrs@minervaux2.fciencias.unam.mx

Journal of Herpetology

Published by: **The Society for the Study of Amphibians and Reptiles**

« [previous article](#) | [next article](#) »

Journal of Herpetology 41(4):733-740. 2007

doi: 10.1670/06-276.1

Effects of Land-Cover Transformation and Climate Change on the Distribution of Two Microendemic Lizards, Genus *Uma*, of Northern Mexico

Claudia Ballesteros-Barrera¹, Enrique Martínez-Meyer^{1,2}, Héctor Gadsden³

Conservatism of Ecological Niches in Evolutionary Time

A. T. Peterson,^{1*} J. Soberón,² V. Sánchez-Cordero³

Theory predicts low niche differentiation between species over evolutionary time scales, but little empirical evidence is available. Reciprocal geographic predictions based on ecological niche models of sister taxon pairs of birds, mammals, and butterflies in southern Mexico indicate niche conservatism over several million years of independent evolution (between putative sister taxon pairs) but little conservatism at the level of families. Niche conservatism over such time scales indicates that speciation takes place in geographic, not ecological, dimensions and that ecological differences evolve later.

en los que se ha demostrado su gran utilidad y poder de análisis

El Modelado de Nichos Ecológicos

Espacio ecológico

Modelo de nicho ecológico

Algoritmo de modelado

Proyección al escenario geográfico

Espacio geográfico

Datos de entrada

Información Ambiental

Registros de presencia de una especie

Producto

Distribución potencial predicha

El Modelado de Nichos Ecológicos

Relación del espacio geográfico y el espacio ecológico

Espacio geográfico
2-dimensiones

Espacio ecológico
 N -dimensiones

Capacidad predictiva de los modelos de nicho: Camaleones en Madagascar

Distribución predicha de los camaleones en Madagascar

Brookesia stumpffi

Furcifer oustaleti

Furcifer pardalis

Furcifer verrucosus

Evaluación de la capacidad predictiva de los modelos

Sitios	<i>C. brevicornis</i>	<i>C. gastrotaenia</i>	<i>C. nasuta</i>	<i>C. parsonii</i>	<i>F. lateralis</i>	<i>F. pardalis</i>	<i>F. oustaleti</i>	<i>F. verrucosus</i>	<i>B. nasus</i>	<i>B. stumpffi</i>	<i>B. superciliaris</i>
Berara	-	-	+	-	+	+	+	-	-	+	-
NE Manongari	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-
Bemanevika	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-
Lohanandroranga	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-
Tampolo	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
Andranomay	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+
Ambatovy	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	+
Ankazomivady	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-
And./Rano. Corrido	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+
Ivohibe Corridor	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	+
Bemananteza	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-

Zonas de sobrepredicción en los modelos

Muestreo en campo dirigido:

7 especies nuevas en los sitios de sobrepredicción

El modelado de nichos ecológicos a través del espacio

Potencial de invasión de especies exóticas

Zambrano *et al.* 2006. *Canadian J. Fisheries*

Potencial de invasión de especies exóticas

Zambrano *et al.* 2006. *Canadian J. Fisheries*

Distribución potencial en América.

Los puntos representan poblaciones establecidas

El Modelado de nichos ecológicos en el tiempo

Efecto del cambio climático en la distribución de 2 salamandras en el centro de México

Parra et al. 2005. *Biotropica* 37: 202-208

Especie	Distribucion		Distribucion		
	Historica	predicah al 2050	Se mantiene	Se peirde	Se gana
<i>P. leprosa</i>	27,025 km ²	7,204 km ²	6,861 km ² (25.38%)	20,164 km ² (74.61%)	343 km ² (1.26%)
<i>P. cephalica</i>	44,551 km ²	39,356 km ²	37,794 (84.83%)	6,757 km ² (15.16%)	1,562 km ² (3.50%)

Plantas en el Pleistoceno-Reciente

(Martínez-Meyer & Peterson. 2006. *J. Biogeo.* 33: 1779-1789)

Modelo para *Braschenia schreberi*

Modelo 21k

Proyección al presente

Modelo en el presente

Proyección a 21k

Otras aplicaciones de las reconstrucciones climáticas

Phylogeographic Analyses and Paleodistribution Modeling Indicate Pleistocene In Situ Survival of *Hordeum* Species (Poaceae) in Southern Patagonia without Genetic or Spatial Restriction

Mol. Biol. Evol. 26: 907-923. 2009

Sabine S. Jakob,* Enrique Martinez-Meyer,† and Frank R. Blattner*

FIG. 4.—Present (dark gray and black) and past (light gray and black) distribution models of the three *Hordeum* species in southern South America calculated with GARP on the basis of extant occurrence points (white dots) of the species. The given potential distribution areas during the last glacial maximum (about 21,000 years ago) are consensus areas from two different Pleistocene climate models. Apart from inland Patagonia and Tierra del Fuego, the models infer the potential distribution of the *Hordeum* species in all areas where they occur today also during the last glacial maximum.

Recapitulando:

El proceso del modelado de nichos

Paso 1

Reunir y procesar datos biológicos:

1. Georreferenciar y dar formato a datos de presencia (y de ausencia cuando existen) de las especies a analizar.
2. Cuando es necesario, manipular los datos para reducir el sesgo del muestreo

Reunir y procesar capas ambientales para generar las variables predictoras:

1. Dar formato adecuado
2. Seleccionar el área de análisis
3. Analizar las capas para identificar problemas de colinealidad y, en su caso, reducir el número de variables

Recapitulando:

El proceso del modelado de nichos

Paso 2

Decidir el tipo de algoritmo de modelación (e.g., GLM, GAM, GARP, MaxEnt, Bioclim, etc.) según el tipo de datos biológicos con los que se cuenten (e.g., sólo presencia, presencia-ausencia)

Calibrar y parametrizar el algoritmo de modelado:

1. Establecer los datos de calibración/validación
2. Establecer los parámetros de modelación
3. Hacer pruebas para determinar la importancia de las variables predictoras

Recapitulando:

El proceso del modelado de nichos

Paso 3

Validar los modelo resultantes mediante la colecta de nuevos datos o mediante una partición *a priori* usando métodos estadísticos (e.g., AUC, Kappa, X^2 , etc.)

Proyección del modelo en espacio geográfico

Recapitulando:

El proceso del modelado de nichos

Paso 4

Proyección a otro escenario geográfico (espacial o temporal) y evaluar estadísticamente (si es posible) dicha predicción

Procesamiento *post hoc* para abordar la pregunta inicial, e.g.:

1. Recortar el mapa de distribución potencial para aproximarlos a distribución histórica o actual.
2. Análisis de distribución en espacio ecológico

El lado oscuro de los modelos de nicho

son las fuentes y
los niveles de
incertidumbre

La incertidumbre en las localidades

Por John Wieczorek

Thomomys bottae

Localidad de colecta:
Davis, Yolo County, California

“Davis, Yolo County, California”

Coordenadas: 38.5463 -121.7425

Datum: NAD27

“método de punto”

“Davis, Yolo County, California”

Coordenadas:

38.5486 -121.7542

38.5450 -121.7394

Datum: NAD27

“método de caja”

“Davis, Yolo County, California”

- Coordenadas: 38.5468 -121.7469
- Datum: NAD27
- Incertidumbre máxima: 8325 m

“método punto-radio”

“Davis, Yolo County, California”

“método de polígono”

“20 mi E Hayfork, California”

“método de probabilidad”

Localidades con y sin incertidumbre

T. bottae

Incertidumbre:
 3.3 ± 6.3 km
 $n = 2624$

Evaluación del efecto de la incertidumbre

Dentro de cada área de incertidumbre se generan puntos al azar y se construyen modelos de nicho ecológico con diferentes juegos de datos

El efecto de la incertidumbre en los modelos de nicho

2. Incertidumbre generada por las capas ambientales

Las capas ambientales son frecuentemente mapas generados por interpolación espacial de datos puntuales

2. Incertidumbre generada por las capas ambientales

Resolución espacial de las capas ambientales

Modelo de distribución potencial

Alouatta pigra

1 km tamaño de celda

50 km tamaño de celda

3. Incertidumbre en escenarios de cambio climático

Existen diversos escenarios tanto para el futuro como para el pasado

Multi-model Averages and Assessed Ranges for Surface Warming

Incertidumbre en los escenarios climáticos

Distribución predicha de *Colias paleaeno* bajo 4 escenarios climáticos

4. Incertidumbre en algoritmos de modelado

Modelo con Maxent

Modelo con GARP

5. Incertidumbre por el efecto de las interacciones bióticas

Conclusiones

Los MNE son métodos de tipo correlativos, estáticos y no mecanísticos, que funcionan identificando las relaciones que existen entre las condiciones del ambiente y los sitios de presencia de las especies.

Para hacer el mejor uso de los NE es muy importante conocer su funcionamiento, pero igualmente importante es necesario conocer las limitaciones de las fuentes de datos, algoritmos y del enfoque metodológico en general

A pesar de sus limitaciones, los modelos de nicho son una herramienta muy poderosa para generar hipótesis geográficas sobre la distribución presente, pasada y futura de las especies

GRACIAS

emm@ibiologia.unam.mx